



A QUI ET QUAND PROPOSER UN TEST DE DÉPISTAGE AU VIH ? >>>

OBLIGATOIRE >>>

- Lors d'un **don de sang, d'organe, de sperme** ou de **lait**

A PROPOSER SYSTÉMATIQUEMENT >>>

SITUATIONS CLINIQUES

- Signes compatibles avec une primo-infection **VIH**
(Fièvre, amaigrissement, arthro-myalgies, pharyngite, adénopathies, manifestations cutanéomuqueuses, neurologiques, diarrhée, cytopénies, syndrome mononucléosique, cytolyse hématique.)
- Pathologies **opportunistes**
(Pneumocystose, toxoplasmose, cryptococcose, CMV, lymphome, cancer anal ou du col de l'utérus, zona, dermatite séborrhéique.)
- **Tuberculose, Hépatite B ou C,**
- **IST** (infections sexuellement transmissibles : syphilis, infection à gonocoque, chlamydia trachomatis, herpès génital).

RECOMMANDÉ >>>

POPULATIONS EXPOSÉES À UN RISQUE ACCRU

- Usagers de drogues par injection : **Tous les ans**
- Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes :
Tous les 3 mois
- Personnes originaires d'Afrique subsaharienne et des Caraïbes :
Tous les ans

AUTRES SITUATIONS

- Après une exposition à **risque** de contamination par le VIH (sexuelle ou sanguine, dont professionnelle) (AES)
- Travailleur.euse du **sexe**
- Prescription **contraception**, projet d'arrêt du préservatif
- Demande d'interruption volontaire de grossesse (**IVG**)
- En cours d'**incarcération**
- Grossesse ou couple avec **projet de grossesse**
- Après un **viol**
- Pour toute personne le demandant, quel qu'en soit le motif
- Pour toute personne **entre 15 et 70 ans** au moins 1 fois dans sa vie

